



**BODENSEE-
HOCHRHEIN-
PRIVATKLINIK-GMBH**

Operationen an den Weichteilen des Gesichts

Lidchirurgie - Oberlider

Bereits in dem 2000 Jahre alten indischen Dokument der Sushruta wurde die Chirurgie der Lider beschrieben. Im 10. und 11. Jahrhundert führten arabische Ärzte die Korrektur der Dermatochalasis (Schlupflider) mit gebogenen Brenneisen durch.

Die alterbedingte Erschlaffung der Oberlider in Kombination mit dem Absinken der Augenbrauen führt zu einer Vergrößerung der Deckfalte an den Oberlidern.

Es findet sich ein Hautüberschuss verbunden mit einer Vorwölbung von Fettgewebe (Fetthernie)

Nach Festlegung des Schnittmusters mit einem Markierungsstift auf den Lidern werden in Lokalanästhesie die Exzision der Haut und die Reduktion des Fettkörpers vorgenommen.

Vorsicht! Zuviel Fettreduktion führt zu einer kosmetisch störenden Vertiefung des Oberlides.

Die Operation wird in örtlicher Betäubung oder in Vollnarkose durchgeführt. Dauer des Eingriffs ca. 50 Minuten pro Seite.

Postoperativ zu beachten:

- Kopfverband für 1 Tag
- Danach feucht warme Kompressen für 7 Tage (zu Hause durchführbar)
- Fädenentfernung nach 3 Tagen
- Gesellschaftsfähig nach 14 Tagen