



**BODENSEE-
HOCHRHEIN-
PRIVATKLINIK-GMBH**

Operationen an den Weichteilen des Gesichts

Midface - Opening oder frontozentofaziales Lift

Zur Vermeidung präauriculärer Narben (Schnittführung vor dem Ohr) haben Prof. Dr. Fuente del Campo und Hagerty bereits 1993 über einen Zugang über das Augenunterlid (subziliar) eine Möglichkeit zur Mittelgesichtsstraffung bei jungen Patienten geschaffen.

Diese Technik wurde durch Prof. Dr. Dr. Hönig und Dr. Wuchner so modifiziert, dass durch einen kleinen Schnitt im temporalen Bereich (Schläfenregion) ein seitliches Stirnlift mit Augenbrauen-anhebung und ein zentofaziales Lift - FZFL - in einer Sitzung möglich ist.

Die Operation wird wahlweise in Lokalanästhesie, Dämmer Schlaf oder Vollnarkose durchgeführt.

Postoperativ zu beachten:

- Kopfverband für maximal 3 Tage
- Haarwäsche am 3. Tag nach Operation
- Fadenentfernung nach 10 - 12 Tagen
- Lymphdrainagemassage nach der 1. Woche durch qualifizierte Physiotherapeutin
- Gesellschaftsfähig nach 14 Tagen
- Sonneneinstrahlung und Höhensonne für 6 - 8 Wochen vermeiden
- Kein Sport für 3 Wochen